

傷寒百問

傷寒百問卷三

第二十九問往來寒熱者何也

往來寒熱者陰陽相勝也。陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。大抵有三證。小柴胡湯。柴胡桂枝乾姜湯。并大柴胡湯也。仲景曰。血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。與正氣分爭。往來寒熱。休作有時。小柴胡主之。又云。傷寒五六日中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩而喜不嘔者。小柴胡也。傷寒五六日已發汗後。下之。胸脇滿。小便不利。渴不嘔。頭汗出。往來寒熱。心煩。柴胡桂枝乾姜湯也。傷寒十余日熱結在

裡往來寒熱者大柴胡主之

第三十問傷寒如瘧狀何也

形證似瘧有太陽證有陽明證有婦人熱入血室證  
太陽證形似瘧一日再發而脈洪大者宜桂枝二  
黃一湯傷寒八九日如瘧然熱多寒少其人不嘔清  
便欲自可日一二發者麻黃桂枝各半湯若脈微而  
惡寒者不可更發汗宜桂枝二越婢一湯也有陽明  
證煩熱汗出如瘧然日晡發熱而脈浮虛者與桂枝  
湯脈實者宜承氣湯婦人熱入血室其血必結故使  
如瘧狀小柴胡主之

第三十一問如何是表證

發熱惡寒身體痛而脈浮者表證也雖然發熱惡寒

證太陽病

或已發熱或未發熱必惡寒若只惡寒不發熱者陰也於少陰中求之不可表也

身體痛

脈浮者蓋身體痛太陽病必惡寒然身體痛而尺中遲者未可表也溫家雖身體

痛亦不可表也少陰下利而身體痛亦不可表也年有霍亂一證吐利不止身體痛不休者可用桂枝湯

和之而脈浮者是表證可發汗  
浮者陽也其脈按之不足舉之有余素問

曰寸口脈浮而盛病在外寸口脈沉而堅曰病在中仲景云脈浮者病在表可發汗又曰表有病者脈當

浮又曰結胸證脈浮者然病人腹間左右上下有禁

觸動氣者皆未可表也

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止第傷肉爾此為

逆治先服防風白朮牡蠣湯汗止次服建中湯初氣在右不可發汗發汗則無而渴心煩飲則吐水尤

與五苓散三服。次服竹葉湯。動氣在上不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。宜李根湯。動氣在下不可發汗。發汗則无汗。心中大煩。骨節煩疼。目運惡寒。食即反吐。穀不得化。先服大橘皮湯。吐止後服小建中湯。傷寒發表固當隨證輕重而汗之。然古人發汗四時皆不同。春不可大發汗。以陽氣尚弱。不可至奪。使陰氣勝于時。天寒初解。營衛腠理緩。可用小柴胡輩。冬不可汗者。以陽氣伏藏。不可妄擾。不問傷寒中風并數日。桂枝麻黃各半湯。或得少汗而解。或無汗自解。不汗者。夏月天氣太熱。玄府開。脉洪大。宜正發汗。但不可用麻黃。桂枝性熱。藥須用桂枝麻黃。則內加黃芩石膏。知母升麻也。如麻法在傷寒傷風門中。夏月有桂枝麻

黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣使發黃斑出也。白虎湯雖可用如前論治中暑與汗後一解利藥耳。一白虎未能逐表邪況夏月傷寒熱病或氣虛人妄投白虎往往有成結胸者以白虎性寒非治傷寒藥也。凡發汗欲令手足俱用熱然一時許爲佳不欲如水瀉離服湯中病即止不必盡劑然發汗須如常覆腰以下厚衣蓋腰以下難得汗雖得半身已上腰已下至足心微潤病終不解凡發汗病證仍存者三日內可二三汗之令腰脚周遍爲度

第三十二問如何是裏證

陽明證當下少陰證口燥咽乾當急下傷寒表證未

罷慎不可亂投湯劑虛其胃氣也須是腹滿身重不

惡寒惡寒者表證也反惡熱頭疼汗出手掌心并腋下繫繫

滋潤胃中乾渴燥糞結聚方可下也此所謂陽表證

已罷陽明證見固可下也若脈浮者亦未可下也脈

者足太陽陽明如此者可桂枝湯少發汗和表證已

罷陽明證見脈沉實固可下他證若小便清與小便

少亦未可下仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱

在表也當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯陽明病或

汗或有不汗大便雖硬小便少者未宜攻恐津液還入

胃小便自如下證悉具設當行大承氣亦須先少與

不可攻之

小承氣二三劑，聽其腹中，若轉失氣，即有燥屎。

轉失氣，今

人謂之乃可攻之。若不轉失氣，此爲緊後溏，慎不可

攻也。明日又不大便，脈反微濡者，裏虛也，爲難治。若

少陰病二三日，口燥咽乾者，承氣湯急下之，非若陽

明證可緩也。

少陰主腎，腎爲本。傷寒熱氣入於藏，深

乾者，須宜急下之。若不口燥咽乾，而脈沉微者，須急溫之。宜四逆湯。雖然，陽明證亦有

急下者。仲景云：陽明病發熱汗出多者，急下之。

陽明屬胃

汗多則胃汁乾，亦須急下也。

更有心胃連膈，腹大段痞悶，或腹中

疼痛，坐臥不安，胃悶喘急極者，亦不候它證，便須下

之。此蓋已急也。凡人便秘妨問，恐有裏證者，

須少少



傷寒論卷之六  
氣血下不可過。若失下，則氣血不通，四肢便厥。醫人多令大瀉也。不識却疑是陰厥，復進四逆輩，禍如反掌。大抵熱厥須脈沉伏而滑，頭上有汗，手掌常溫，時復指稍溫，便可下之。此皆仲景之玄旨也。大率傷寒下後，慎不可服補藥。孫真人云：服大承氣得利，差慎不可補也。熱氣得補，復成更復下之，是重困也。宜消息安養之。縱當服藥，亦須平和。

第三十三問 仲景有發汗者有和解者，何也？

傷寒表證，須看營衛淺深，故仲景有正發汗湯劑如麻黃桂枝，大青龍是也。有和解其表如小青龍桂枝。

麻黃各半湯、白虎湯、桂枝二越婢一湯、柴胡桂枝湯、小柴胡之類是也。後人不能深究寒熱淺深，藥性緊慢一槩用藥，因致大傷。其間縱獲生全，往往汗後虛乏，遂致勞復，或變生百病，淹引歲月，卒至不救。此皆由汗下過度，陰陽並竭，血氣羸損，以致此禍。如遇病輕，但當和解之，所謂和其營衛，以通津液，令其自解也。

第三十四問：仲景有宜下之，有微和其胃氣者，何也？

傷寒裏證須看熱氣淺深，故仲景有宜下之，如大承

氣小承氣十棗湯大柴胡是也有微和其胃氣如調  
胃承氣脾約圓少與小承氣微和之類是也金匱玉  
函云虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者瀉勿  
大洩之梅師亦云宿病老弱人使不令藥力相及爲  
佳耳故王叔和序傷寒有承氣之戒又問轉藥孰  
緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣又次之  
大柴胡又次之

第三十五問傷寒不得汗何也

甲乙經云熱病脉常躁盛而不得汗者此陽脉之極  
也死脉躁盛而得汗者生大抵傷寒營衛俱病則無

汗麻黃葛根湯大青龍湯無憂散主之。冬及正月天氣尚寒，其時傷寒，不得汗，面赤惡寒發熱身疼，可用神丹圓神白散發汗。傷寒連服七八劑湯發汗，汗不出者死。如中風，法蒸之溫熱之，氣於外迎之，无不得汗也。古今用有，効薪火燒地良久，掃除去火，可以水洒之。取蠶沙、栢葉、桃葉、糠粃皆可用，相和鋪燒地上，可側手厚上鋪席，令病人於上臥溫覆之。夏月熱，只布單覆之。汗移時立至。俟周身至脚心皆汗，繫繫乃用溫粉撲之止汗。移上床，最得力者，蠶沙、桃栢葉也。無蠶沙，亦得單、桃葉、栢葉，亦得蒴藋，亦可用。麩糠乃

助添令多者不用亦得

若汗多不止可用薑木粉之若汗出多亡陽逆惡風煩

躁不得臥者先服防風白朮牡蠣湯次服小建中湯

### 第三十六問汗之而寒熱者何也

太陽證發汗後依前寒熱者須看脉如何若脉浮數

或洪大則表證猶在當再表也如桂枝二麻黃一之

類醫人爲見已汗或已下而發寒熱不敢再表誤矣

蓋脉浮爲在表表之必愈也

或大汗出熱不去惡寒若內拘急四肢疼又下

利尿逆者

或得汗而解復如瘧狀日晡而發者此屬

陽明也若脉實者可下之宜大柴胡大承氣也若發

汗後只惡寒者虛也發汗後只發熱者實也

只惡寒者屬陽虛只發熱者屬陽實

其藥調胃承氣湯若大病後勞復微發熱惡寒者小  
柴胡湯中加桂令微汗也

第三十七問汗之而仍發熱者何也

汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗裏狂言不能食謂之  
陰陽交交者死也又曰熱病已得汗而脈躁盛者此  
陰脈之極也死其得汗而脈靜者生今汗之而仍發

熱者若脈浮數則表證猶在汗之必愈也

大抵傷寒熱者忌以

其來極則熱生也表證熱多者須用溫藥表之也仲景凡發熱頭痛脈浮數身體痛即溫其表若腹滿下利者身微痛即溫其裏治傷寒之法無以過也小柴胡證不渴引有微熱者加桂及熱多寒少而脈微弱者桂枝二越婢二之類皆溫表之義也發汗後不敢再表者爲脈沉實

耳脉浮者須再表也。發汗後不惡寒只發熱始脉浮大。今脉沉實始惺惺今狂語此爲胃實陽盛再汗之即死須下之。設令下後又不解表裡邪不棄矣。

仲景云太

陽病三日發汗不解蒸熱者宜調胃承氣湯和其胃氣也大醫云若傷寒得汗後熱不退發昏及狂言者便可調承氣湯下之止食米差再服又有太陽證合行桂枝却用麻

黃之類發汗多亡陽發熱惡風者屬桂枝加附子湯及真武湯更有風溫一證初得病發熱而渴不惡寒雖發汗已身灼熱者爲風溫屬萎蕤湯若傷寒得汗後已解虛羸微熱不去只可行竹葉石膏湯隨其虛實治之

第三十八問下之而熱不退者何也

仲景云大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱其  
人亡血而當惡寒後乃發熱無休止時大抵傷寒八  
日已上大發熱者爲難治又有醫人多用圓子藥下  
之身熱不去微煩者屬梔子乾姜湯陽明下之仍有  
外熱手足溫心中懊憹飢不能食但頭汗出者屬梔  
子豉湯陰弱發熱華蘆苦酒湯仲景又云太陽證服  
桂枝湯或下之仍頭項強翕翕發熱无汗心滿痛小  
便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯宜服此湯

第三十九問汗後有表證者何也



汗後有表證者病未去也汗出脉洪大者與桂枝湯  
若形似瘧一日再發者屈桂枝二麻黃一湯服桂枝  
湯汗出煩渴不解脉洪大屈白虎加人參湯發汗已  
解半日復煩脉浮數者屈桂枝湯發汗後身疼脉沉  
遲者屈桂枝加芍藥生姜人參湯發汗病不解反惡  
寒者虛也屈芍藥甘草附子湯發汗不惡寒但熱者  
實也當和其胃氣屈調胃承氣湯太陽病發汗後大  
汗出胃氣乾煩躁不得眠若脉浮小便不利渴者屈  
五苓散又有發汗多亡陽惡風發熱者如太陽病發  
汗遂漏不止惡風小便難四肢急難以屈伸者屈桂

枝加附子湯。太陽病發汗不解，發熱心忪，頭眩身軀動欲擗地者，屬真武湯。

第四十問下，後有表證者何也？

下，後有表證者，不應下也。太陽病下之微喘者，外未解也。宜麻黃湯。太陽病先發汗不解而復下之，其脈浮，病不愈者，浮爲在表，而反下之，故不愈也。今脈浮，故須解表，則愈。宜桂枝湯。太陽病桂枝證，醫反下之，利遂不止，脈促者，表未解也。汗出而喘者，葛根黃芩黃連湯主之。

脈來緩時一止復來者名曰結脈來數時一止復來者名曰促脈陽盛則促陰

盛則結太陽病下之後，脈促胸滿者，桂枝加芍藥湯主之。

之服桂枝後下之仍頭項強痛者惡寒發熱無汗  
心下滿微痛小便不利者桂枝加茯苓白朮湯主之  
傷寒醫下之後身疼痛不解清便自調者急須救表  
宜桂枝湯陽明中風脈緊浮大而短氣腹都滿脇下  
引痛久按之不通鼻乾不得臥一身及目悉黃小便  
難時時噦耳前後臃刺之少差外不解者勿下之早  
宜麻黃湯

第四十一問病人有表證而脈微細者何也

有表證而脈沉細亦多般不可一槩作陽病見陰脈  
爲難治蓋太陽病發熱脈沉而細名曰瘥太陽病關

節煩疼，脉沉而緩，名曰中濕。夏月伏暑，證外似傷寒，而脉虛，名曰中暑，不可不察也。非特此。仲景云：病人初得病，若發熱，身體疼，師到診其脉，沉而遲者，知其差也。何以知之？若表有病者，脉當浮大；今脉反沉遲，故知愈也。又有得病數日，太陽墜，經脉微而沉者，當隨其證而治之。又有病人而爲醫所病，外證發熱，惡寒而脉微濇者，仲景云：病人脉微而濇，此爲醫所病也。火發其汗，又數下之，其人亡血，病當惡寒，後乃發熱，無休止時。又曰：凡病下之後，發其汗，必振寒，脉微細，所以然者，以內外俱虛故也。

陽微惡寒，四逆，重覆厚衣，發熱，爲內熱，病當愈。

歷昔又有太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒

多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微

緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更

汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不

能得少汗其身必痒宜桂枝麻黃各半湯又有太陽

病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發

汗宜桂枝二越婢一湯又陽明少陽證近裡脈弦細

外證只發熱不惡寒者屬陽明也往來寒熱而嘔者

屬少陽也又曰得病二三日脈微者無太陽證也小

柴胡主之以此知有表證而脈沉細者不可一槩作

陽證見陰脈也

第四十二問表裡兩證俱見者何也

假令病人脈浮而大是表證當汗其人心下滿口不  
飲食是裏証當下此兩證俱見者俱看若煩渴躁熱  
小便赤澁四肢煩熱雖脈浮亦當下微和其胃氣若  
支節痛不引飲無煩渴手足微冷雖胸脇滿悶亦有  
表證而脈遲者即不可汗亦不可下宜以小建中理  
中湯調治之假令病人心下滿口不欲食大便硬脈  
細者是裏証當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當  
汗此兩証俱見者仲景所謂半在裡半在表小柴胡

主之。假令病人咽燥，口苦，腹滿而喘，發熱汗出，不惡寒，反惡熱，是陽明證。當下其人脈浮而緊，却當汗。此兩証俱見者，不可發汗。汗之則心中躁，譫語不可下。下之則胃中空虛，客氣動，心中懊憹，舌上有胎者，仲景以梔子豉湯吐之。亦宜此此三証皆仲景治表裡兩證俱見法。其它可以類推也。千金救內解表三黃石膏湯亦治表裡兩證俱見之法也。

第四十三問無表裡証者何也

傷寒四五日後，以至過經無表証。又於裏証未可下者，但非汗証亦非下証者，皆可小柴胡隨証加減用。

之。以至十余日者，亦可用。十余日外用小柴胡，不愈者，若大便硬，看証而可用。大柴胡下之，以過經。其人氣稍虛，當下者，用大柴胡，則穩。蓋恐承氣湯太緊，病人不大，祭也。仲景云：病人無表裡證，發熱七八日，脈雖浮數，可大柴胡下之。假令已下，脈數不解，至六七日，不大便者，有瘀血也。屬抵當湯。又云：六七日，目中不了了，睛不和，無表裡證，大便難，身微熱，此爲實也。當下之，宜承氣湯。

第四十四問 表熱裏寒，表寒裏熱者，何也？

表熱裏寒者，病人身大熱，反欲得衣被，不飲水，脈沉。



而遲手或微厥下利清穀皆是表熱裡寒所以  
亦有發熱者桂枝去芍藥加附子湯四逆湯通脈四  
逆湯主之若內寒外熱虛煩者先與陰旦湯也桂枝去芍藥  
黃芩也表寒裡熱者病人身涼反不欲衣被尸煩  
煩渴脈滑而厥皆表寒裡熱白虎湯主之若少陰惡  
寒而踴時時自煩不欲厚衣用大柴胡下之無不愈  
者此皆仲景之餘識也

傷寒百問卷四

第四十五問如何是陽證

太陽陽明少陽皆屬陽證也。若陽氣獨盛，陰氣暴絕，發躁狂，走妄言，面赤，咽痛，身斑斑，若錦紋，或下利赤黃，脉洪實，或滑促，名曰陽毒，宜用酸苦之藥，折熱復陰。加苦參、大青、葶藶、苦酒之類，令陰氣復而大汗解矣。葶藶苦酒湯、葛根龍膽湯、冰解散、黑奴圓、陽毒散、抱龍圓、消溫散、承氣湯、三解毒、升麻湯。

第四十六問如何是陰證

陰證者，頭微疼而不甚，咽中痛。

邪客於少陰，故不發熱，而身重，脈沉，手足逆冷，此陰證也。

或痛而身亦不熱

亦有熱者乃表熱裡寒

乃脉沉細也

甲乙經云

邪生於陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之飲食

起居不時者陰受之陽受之則入腑陰受之則入臟

入六腑則身熱不時臥爲喘呼入五臟則臍滿閉塞

下爲飧泄久爲腸澼大抵陰證者由冷物傷脾胃陰

經受之也口中味淡面色及唇皆白而無光手足冷

脉沉細情緒亦不因嗜欲但內傷冷物或損動胃氣

遂成陰證又問何故經中云一二日少陰病也

答曰此是初中病時腠理寒便入陰經只惡寒不發

熱者是也。蓋寒氣入太陽經則發熱而惡寒入少陰

經則惡寒而不發熱也。三陰中寒微則理中湯加減

又枳朮或中寒下利則乾姜甘草湯

手足指頭微厥冷謂之清此未

清與四逆蓋疾微故也

若大段重者用四逆湯無脈者用通脈

四逆湯也。近人多不識陰證才覺胃脘不快便喫食

藥而自利胃脘愈不快又進食藥後吐而利經一二

日遂致不救蓋不知是寒中太陰也太陰脾之經主

胃脘腹脹亂投食藥非其治也又問萬一飲食不

節胃脘不快寒中陰經以何法治之答云急作理

中湯加青橘陳橘則爲啖咀服一二劑胸脘即快此

皆人所未論也

第四十七問有陰毒有少陰有陰陽易何以別之  
陰毒之爲病初得病手足冷背強咽痛糜粥不下毒  
氣攻心心腹痛短氣四肢厥逆嘔吐下利體如被杖  
陰毒甘草湯返陰丹正元散主之  
大抵陰毒本因腎  
氣虛寒或因冷物傷脾外感風寒內既伏陰先感外  
寒而內伏陰則內外皆陰而陽氣不守遂發頭痛腰  
重身體倦怠四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多  
煩渴精神恍惚如有所失三兩日間或可起行不甚  
覺重診之則六脉俱沉細而疾尺部短小寸口或大

六部脈俱浮大或沉取之若服涼藥過多則渴甚躁

大而不甚疾者非陰證也

轉急也有此證者便須急服退陽散退陰散五勝散

一日或二日即安若陰毒漸深其候沉重四肢逆冷

腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬煩渴虛汗

不止或時狂言指甲面色青黑六脉沉細而表一息

七至已來有此證者連於氣海或關元二穴灸三二

百壯以手足和煖爲効仍服金液丹來甦丹順元散

兼黑附子散却陰散若陰毒已深病勢因重六脉附

骨取之有舉之則无一息八至已上或不可數也至

此則藥餌難爲攻矣但於臍中用葱熨法或灼艾三

二百已來手足不溫者不可治也。如得手足溫，即服  
前，硫黃及熱藥助之。若陰氣散，陽氣來，即漸減熱藥  
而調治之。若陰結，胃返陰丹主之。少陰之爲病，脉  
微細，欲吐不吐，心煩但欲寐，五六日自利而渴，或小便  
白，增損四順湯。黃連阿膠湯。吳茱萸湯。通脉四逆  
湯。四逆散。桔梗甘草湯。半夏散主之。陰陽易之爲病  
其人身體重，少氣，令人陰腫入腸內絞痛，婦人則裡  
急腰膝連腹內痛，名陰陽易也。燒褌散。蠟鼠糞湯。竹  
皮湯。乾姜湯。青竹茹湯。當歸白朮湯主之。  
陰陽易者，是男子婦人傷寒新差，未平復爲交接成此証也。其毒衰氣度著於人，如換易之義。

第四十八問三陰有可汗者乎

陰病不當發汗。發汗則動血。然太陰脈浮。少陰發熱。亦須微微取汗。但不正發汗耳。大抵風寒中人。與營衛相薄而發熱。又未嘗行諸汗藥。雖無陽證。須少汗解遂之。王叔和云。表。中風寒入裡。則不消。故知初病。脈沉細數。雖表不消。蓋表。中風寒須宜溫覆。少汗而解。桂枝湯。麻黃細辛附子湯。麻黃附子甘草湯。皆陰證表藥也。

第四十九問三陰有可下者乎

三陰大約可溫。然有積證者。方可下也。何謂積證。太



陰腹滿時痛

非枝倍芍藥湯  
陽甚者加大黃

少陰口燥咽乾或下利

清水心下痛或腹滿不大便

大柴胡  
承氣湯

皆積證也

第五十問三陰有發熱者何也

太陰厥陰皆不發熱只少陰發熱有二證仲景謂之

反發熱少陰初得病有發熱并裡寒外熱二證陰然

陰證發熱終是不同脉須沉或下利手足厥也

少陰  
病初

得之身熱脉沉者麻黃細辛附子湯主之少陰  
病下之利清穀裏熱不足厥逆四逆湯主之

第五十一問陰證似陽何以別之

陰發躁熱發厥物極則反也大率以脉為主華陀云

諸數爲熱諸遲爲寒爲如此最驗也假令其人身體

微熱煩燥面赤其脉沉而微者皆陰證也身微熱者裡寒故也煩燥者陰盛故也而戴陽者下虛故也若腎者不着脉以脈陽上屬躁誤以爲實熱反與涼藥則氣消成大病矣外臺祕要云陰盛發躁名曰陰躁欲坐非中宜以熱藥治之仲景少陰證而赤者四逆湯加葱白主之

少陰病證者發汗血或從口鼻出者亦陰證似陽也

第五十二問陽証似陰何以別之

重陽必陰重陰必陽寒暑之變也假令手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑色其脉沉而滑者皆陽證也四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深速用大承氣湯

加減劑下之汗出立差

仲景所謂服藥下之者此也

兼熱厥與陰

厥自不同熱厥者微厥即發熱若陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉而細大小便滑泄矣

第五十三問身冷脉細沉疾煩躁而不飲水何也傷寒陰盛陽者病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即差此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈火熾散丹砂丸並主之

第五十四問手足逆冷者何也

厥者逆也陰陽不相順接手足逆冷也陽氣衰陰氣

盛陰勝於陽故陽脉爲之逆不通於手足所以逆冷

也傷寒熱多厥少者其病當愈厥多熱少者其病爲

進然有冷厥有熱厥當子細辨認冷厥者初得病日

便四肢逆冷脉沉微而不數足多痺卧而惡寒或自

引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自調清便自調即是大便

或小便數外證多惺惺而靜脉雖沉實按之遲

而弱者知其冷厥也四逆湯理中湯四逆湯當

猪膽湯皆熱厥者初中病必身熱頭痛又別有陽證

至二三日乃至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日

却身熱蓋熱氣深則方能發厥須在二三日後也若

微厥即發熱者熱微故也其脈雖沉伏按之而滑爲

裡有熱其人或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便

秘小便赤外證多昏慣者知其熱厥也

白虎湯承氣湯證用之

仲景云傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱後

必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微應下之而反發

汗者口傷赤

熱厥當下故云厥應下之者若反發汗必口傷赤爛也

又有下

證悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥

醫人不識却疑是陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱

厥須脈沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指甲溫

須便用承氣湯下之不可拘忌也

手足逆冷皆屬厥陰不可下不可汗

然有須下。有須汗。証者謂手足雖逆冷時有溫時手足常心必煩非正厥逆也當消息之若病人寒熱而厥面色不澤胃味而兩手忽無脈或一手無脈者必是有正汗也。多用綿衣包手足令溫暖急服五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之。晡時必大汗而解矣。或傷寒厥逆而心下怔忡者宜先治水當服茯苓甘草湯却治厥不爾水漬入胃必下利也。又有病人手足厥冷脈乍結者邪氣結在胃也。心下滿而煩飢不能食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散。蓋病在胸中亦能令入手足厥但認脈乍結者是也。陰虛則結脈來緩時一止若傷寒發厥至七八日膚

冷而躁，无時暫安者，爲藏厥。此爲難治。又問仲景少陰四逆湯，又有四逆散何也。答曰：大抵少陰病，不可便用熱藥。且如少陰病，亦有表熱者。仲景謂之，晚發熱，用麻黃細辛之類，以發汗。終不成，少陰證，便不得發汗。耶。今少陰病，四肢冷，亦有內熱者。仲景用四逆散是也。四逆湯用附子乾姜而四逆散主四逆也。其人或欬或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重，已上病皆熱證耳。

第五十五問吐長蟲何也

蛇厥者，臟寒。蛇上入膈，其人吐蛇也。此是厥陰證，或

病人有寒，復發其汗，胃中冷，及因發汗後身熱重，發其汗，胃中虛冷，故長蟲逆上，烏梅丸主之。

第五十六問兩感傷寒其治法如何

兩感者，表裡俱病也。太陽與少陰爲表裡，陽明與太陰爲表裡，少陽與厥陰爲表裡，陰陽雙傳，臟腑俱病，此爲難治。六日而死矣。

一日太陽與少陰俱病，則頭痛口乾煩滿而渴。二日陽明

與太陰俱病，則腹滿身熱不欲食，諸言三仲景無治

日少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥。

法。但云兩感病俱作，治有先後。發表攻裏，本自不同。尋至第三卷中言傷寒下之後復下利不止，身疼痛者，急當救裡，宜四逆湯。復身體疼痛，清便自調者，急



當救表宜桂枝湯遂以意尋此做効治兩感有先後  
宜先救裡若陽氣內正即可醫也內才正急當救表  
蓋內才爲急才溫內則急救表亦不可緩也傷寒傳  
兩感者  
爲必不死設有諸異說能消息湯藥  
无不愈者其有死者乃醫殺之耳

第五十七問潮熱者何也

潮熱者大率當下仲景云潮熱者實也大承氣湯證  
內云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無疑矣雖  
然更看脉與外證脉若弦若浮及外證惡寒猶有表  
證且與柴胡以解之若腹大滿不通者可與小承氣  
微和其胃氣勿令大泄也  
仲景云日晡發熱者爲陽  
明也脉實者大承氣大柴

胡也。厥陰也。縱使潮熱當行，大承氣亦須先少與。小承氣若不轉失氣，不可攻之。後發熱腹硬者，大柴胡下之。又有日晡發潮熱，已而微利者，又有微發熱潮熱，而大便秘者，或潮熱而噤者，皆當用小柴胡也。傷寒十一

二日不解，胃腸滿，而嘔，日晡發潮熱，已而微利者，實也。先服小柴胡以解外，後以大柴胡湯下之。陽明潮熱，大便秘，胃滿，不去者，小柴胡主之。冬陽明潮熱當行，黃芩湯。冬陽明潮熱，發熱，汗黃，冬湯也。又問：已上潮熱並屬陽明。

也。太陽有潮熱乎？仲景大陷胸湯，一證結胸有潮熱者，爲大結胸，屬太陽也。

第五十八問 頭疼者何也

頭疼者陽證也太陽證麻黃桂枝主之若已發汗未發汗頭痛如破者連翹葱白湯服而不止者葛根葱白湯主之陽明證頭疼者胃實故也

陽明氣實調胃故攻頭也

承氣主之少陽證小柴胡主之太陰少陰經但不至頭唯厥陰經挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頰頰連目出額故太陰少陰並無頭疼之證仲景只有厥陰一證吳茱萸湯治乾嘔吐涎沫頭疼而已大抵屬三陽者頭疼爲多也若日次頭疼及發寒熱脈緊而不大卽是膈上有涎宜用瓜蒂末一錢暖水調下吐涎立愈又問病人頭疼鼻塞而煩者何證也此屬濕家頭

中有寒濕故鼻塞而頭疼內瓜蒂末鼻中則愈

第五十九問身體痛者何也

太陽少陰厥陰皆有身體痛當以外證與脈別之太

陽證表未解脈浮緊者當身體痛宜麻黃桂枝之類

以汗之

風濕相搏身體疼者當於中濕門中求之

若脈沉而自利身體痛

者陰證也急當救裏宜四逆湯附子湯真武湯之類

以溫之

陰毒身如被杖當於陰毒門中求之

又問發汗後身疼痛脈沉

而遲者當用何藥仲景有桂枝加芍藥生薑人參新

加湯蓋爲此證也小建中湯亦兼治汗後身疼脈沉

而遲者若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者少與桂枝



冬復利其小便故也。故仲景云陽明病發熱汗多者急下之。然陽明汗多急下。小便自利者此爲津液內竭不可攻之。須自大便導之。宜用蜜煎導法。又有汗多而譫語者亦不可下。只與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液。恐大便亡陽有汗。太陽汗出而惡寒當溫作燥屎攻之故也。

陽明汗出而惡寒表未解也。宜桂枝微汗之。若脈尺寸俱緊而汗出亡陽也。此屬少陰法當咽痛而復吐利其人熱不去內拘急四肢寒。柔痙有汗。太陽病發厥逆而惡寒者四逆湯主之。霍亂有汗吐利汗出發熱惡而不惡寒者名柔痙。

厥冷者四逆湯主之。雖然少陰不得汗而亦有反自汗出之證。陽明病多汗而亦有反無汗之證。陽明病多汗也。陽明病多汗而亦有反無汗之證。陽明病多汗也。

行皮中狀者此以久煎故也。又陽明病反汗但小便不利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭疼若不欬不嘔手足柔弱者頭不疼也。陽明病無汗小便不利心中懊憹必當發黃。

第六十一問但頭汗出者何也

病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭

者陽陽九頭汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也

慎不可下下之者謂之裏虛然但頭汗出者有數證

被火而頭汗出者

太陽中風以火去發汗邪風被火熱血流溢失其常度兩陽相煎灼

其身發黃陽盛則為絛陰虛小便難陰陽俱虛身

體則結發但頭汗出背頸而還腰滿微喘口乾咽

或不大便久則語其者至喉手足燥渴按衣摸床

小便不利者其人治陽明按火額上微汗出而小

便不利者濕家爲病但頭汗出者溫家俱頭汗出而

必發黃下之早則嘔或腹滿小便不利舌上生胎此丹田

有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲口燥煩故也濕

家下之額上汗出微喘小便利不發黃但頭汗出者陽

利者死若下利不止者亦死

病但頭汗出，身无汗，背頸而還，小便不利，渴飲，水漿者，此為瘧熱在裡，身必發黃，茵陳湯主之。熱入

血室，而頭汗出者，

陽明病下血，濕語者，此為熱入血室，但頭汗出者，小柴胡主之。諸語

汗出，則血虛，婦人其脈微，乃益血，室虛，孤陽上出。

水結在胸臆間，而頭汗

出者，

陽寒結，留无大熱者，以水結在胸臆，而頭汗出者，但頭汗出者，人陷胃濕主之。

往來寒熱

而頭汗出者，

小柴胡湯主之。心煩者，柴胡桂枝乾姜湯主之。心下懊憹，飢不

能食，但頭汗出者，

但身熱，湯主之。

仲景治法，並無下之者也。

### 第六十二問咽乾者何也

咽乾者，慎不可發汗，發汗則重亡津液也。少陽證口

苦，咽乾者，小柴胡主之。少陰證口燥，咽乾者，急下之。

又於他證可求之。

傷寒又有口乾者，太陽證其渴而口乾者，白虎湯主之。小便不利



者五苓散主之。口乾喜  
嘔者烏梅乾薑九主之。

第六十三問咽喉痛者何也

咽喉痛有兩證。脉浮數而赤。斑斑如錦文。咽喉痛。唾  
膿血者。此陽毒也。脉沉遲。手足厥冷。或吐利。而咽中  
痛。此陰證也。病源云。此爲下部脉希不至。陰陽隔  
絕。邪客於足少陰之絡。毒氣上衝。故咽喉不利。或痛  
而生瘡也。傷寒脉陰陽俱緊。及汗出者。亡陽也。此屬  
少陰。當咽痛而復吐利。此候汗下薰熨。俱汗出者。某  
本。物傳之咽喉痛者。桔梗湯。猪膚湯。半夏散。通脉四  
逆去芍藥加桔梗湯主之。又有伏氣之病。所謂非時。

有暴寒中人，伏氣於少陰經，始不覺病，旬月乃發，脉微，乃法先咽痛，似傷寒，非喉痹之病，次必下利，始用半夏桂甘湯，次四逆散主之。此病只一二旬，便差，古方謂之腎傷寒也。

傷寒百問卷四終

傷寒百問卷五

第六十四問嘔者何也

嘔屬胃足陽明經也。足陽明之氣下行，今厥而上行，故爲氣逆。氣逆則嘔。仲景云：嘔多，雖有陽明證，慎不

可下。蓋爲此也。大抵胃中有熱，穀氣入胃，與熱相并，

氣逆則嘔。

黃連湯黃芩芍藥加半夏  
生薑湯茅根麥門冬湯

胃經汗下，飲水

多冷，陽氣微，胃中虛冷，亦嘔。

理中湯茯苓生薑湯干  
姜黃芩黃連人參湯

諸數爲熱，諸遲爲寒。當以脈別之。然膈氣虛則脈數

也。數爲客陽，不能消穀，胃中虛冷，脈亦數。當問病人

曾與未曾汗下，更以餘證別之。嘔而發熱者，小

胡

也。太陽病過經十餘日，柴胡證仍在者，先與小柴胡。嘔止，少安。若其人復嘔，心下急，鬱鬱微煩者，與大柴胡。下之，即愈。嘔而脇鳴，心下痞者，半夏瀉心湯主之。嘔而發渴者，猪苓湯也。先嘔却渴者，此爲欲解，急與之。先渴却嘔者，爲水停心下。此屬飲家。仲景云：本渴飲水而嘔者，柴胡不可與也。宜治。膈間有水，小半夏加茯苓湯。孫真人云：凡嘔家多服生薑，此是嘔家聖藥。若少陰厥陰發嘔，則外證與脈皆寒也。灸厥陰，白通湯。真武湯。附子加生薑湯。四逆加生薑湯。主之。傷寒差後嘔者，有餘熱在胃脘也。枳朮丸。竹葉加生薑。

湯主之。若病人直患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣入心也當作脚氣治之。

金匱方治脚氣衝心用礬石二兩漿二斗水煎三五沸浸

跟脚

### 第六十五問吐者何也

吐有冷熱二證。脈數引飲食已即吐手心熱胸膈煩躁以熱在胃脘細辛半夏湯黃連湯竹葉湯乾薑半

夏湯五苓散主之。

水道不下者由心經受熱而小便不利故也宜服五苓散能利小便

數脈浮者猪苓散皆行小便自水茯苓亦通氣心與小便相傳故若小便通則心經伏熱自下則水入不吐也

又曾經汗下胃中虛冷食久反出理中湯去木加生

姜也甘草乾姜湯小半夏湯仍吐不止者半夏來

甦丹溫胃丸最良。若病到陰經，須臾須利手足，寒自利，脉沉而遲，咽痛吐，四逆湯。吳茱萸湯。乾姜黃芩黃連人參湯主之。又問小兒吐者何也？小兒尋常吐逆，療之久，不差，在胃，多時遂成慢驚，定吐救生丸主之。若胃虛發吐不止，羸困者，用大丁香丸，无不愈者。

第六十六問乾嘔者何也

乾嘔者，今人所謂嘔是也。傷寒乾嘔者，熱氣在於脾胃也。胃中畜熱，熱氣上薰，則心下痞結，故乾嘔也。桂枝小黃湯。小柴胡十棗甘草瀉心湯。若少陰證，胃氣虛，亦乾嘔，當溫之也。白通四逆茱萸湯。金匱要略，半

夏乾姜散橘皮湯乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之

第六十七問咳嗽者何也

傷寒咳嗽有兩證有太陽證咳嗽小青龍小柴胡是也。有少陰證咳嗽真武湯四逆湯猪苓湯是也。大抵太陽證熱在上焦其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故咳嗽小青龍湯加五味子細辛干姜湯頭疼發熱而嗽者小柴胡湯去芍藥加人參加大棗生薑五味子乾姜肺寒咳嗽聲重多涕者溫肺湯降氣湯若少陰證咳嗽四支沉重疼痛小便不利

自下利而咳。真武湯加五味子細辛。藟姜也。四逆  
逆。腹中痛。或泄利而咳。四逆湯加五味子乾姜也。下  
利而咳。煩渴不得眠而咳。猪苓湯主之。天行時氣咳  
嗽。外臺千金方詳。

第六十八問鼻衄者何也

衄血者熱證也。火乘金而血上溢也。傷寒太陽證衄  
血。有陽氣重故也。仲景所謂陽盛則衄。若脈浮緊無  
汗。服湯不中病。其人發煩。目眠劇者。必衄。小衄而脈  
浮。宜麻黃湯也。衄後脈已微者。不可行也。若脈  
尚浮。自汗服湯不中病。桂枝證尚在。必頭疼甚而致



衄小衄而脉尚浮者再與桂枝也。衄後脉已微者不可行也。大抵傷寒衄血不可發汗者爲脉微故也。苦參湯地黃湯薤金散黃芩芍藥湯主之。其脉細小加嗽者黃芩荊苈散主之。服湯已衄血不止者用茅花湯即差。又法用好緊白龍骨不以多少研令極細塞鼻中血止則已然。不若茅花之妙也。傷寒之病差後小勞便鼻衄牡蠣散主之。又問陰証有衄血者乎。陰証自無熱何緣有衄。若少陰病但厥無汗強發之必動血未知從何道出。或從口鼻或從耳目是謂下厥上竭爲難治。

第六十九問吐血者何也

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應汗而不發汗熱毒入深結於五藏內有瘀積故吐血也犀角地黄湯三黃丸主之 又問非傷寒證吐血者其治法如何蛤粉散不過再服若虛勞肺嗽吐血羸瘦苦咽乾又不可服涼藥者黃耆湯主之

第七十問渴者何也

脈浮而渴屬太陽傷寒表不解心下有水氣而渴者小青龍去半夏加瓜樓根太陽病服桂枝大汗出後煩渴者白虎加人參若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散傷寒四五日身熱惡風，脇下滿，手足溫而渴者，小柴胡去半夏，加人參、桔梗、樓根，主之。太陽證，身體灼熱而渴者，屬風溫也。於風溫中可求之。有汗而渴，屬陽明；陽明病，脇下硬不大便而嘔，舌上白胎而渴者，小柴胡去半夏，加人參、桔梗、樓根。陽明病，但頭汗出，小便不利，渴引水漿，身必發黃，宜茵陳湯。自利渴，屬少陰，傷寒熱入於藏，流於少陰之經，少陰主腎，腎惡燥，故渴而引飲，少陰下利欬而嘔渴，猪苓湯主之。下利欲飲水者，以有熱故，白頭翁湯主之。一切成太陽證，無汗而渴者，不可與白虎湯。仲景云：渴欲飲水，表

證者白虎加人參湯脉浮發熱無汗。是表未解也。不

可與白虎也。五苓散小青龍小柴胡。陽明證汗多

而渴者不可與五苓散。汗多胃中燥者。五苓散復利其小便故也。薤白竹葉

湯與之。仲景云陽明病發作有時。汗出多者急下之。

然太陽病渴終不可與白虎耶。太陽證得汗後脉洪

大而渴者方可與之也。陽明病渴終不可與五苓耶。

陽明證小便不利汗少脉浮而渴者方可與之。此皆

仲景之玄旨也。凡病非大渴不可與水。若小渴咽乾

者少呷。滋潤之。令胃中和。若大渴煩燥甚能飲一斗

者與五升飲之。若全不與則乾煩無由作。汗發喘而

死常人見因渴飲水得汗小渴遂劇飲之致停飲心  
下滿結喘死者甚衆當以五苓散或陷胃丸與之若  
陽毒倍常躁盛大渴者黑奴丸主之中暑伏熱深累  
取不差其人發渴不已酒蒸黃連丸主之又問小  
兒非傷寒證瀉利引飲不已百方治之不差奈何此  
疳證也急作疳治之稍緩即唇齒俱落溫疳丸麝香  
丸主之

第七十一問煩者何也

傷寒煩者由陰氣少陽氣勝故熱而煩在太陽證脉  
浮者宜汗麻黃湯桂枝大青龍湯柴胡桂枝湯主之

然太陽證自汗小便數心煩即不表也在陽明證  
脈實者宜下大柴胡調胃承氣小承氣六承氣主之  
然病已差尚微煩必大便秘當問其小便日幾行若  
小便少津液當還入胃不須攻也在少陽證當和表  
小柴胡去半夏人參加枯樓根柴胡桂枝乾姜湯若  
傷寒六七日無大熱其人煩燥者此茯苓湯黃連阿  
膠湯上之凡病傳陰經須吐利而煩黃連阿膠湯止  
煩兼利也然有汗之而煩者服桂枝湯大汗出  
後病不解脈洪大者白虎加人參湯發汗已脈  
浮數煩渴者五苓散陽明病本有汗出醫更發汗大

便硬微煩者以亡津液胃中有燥矢也當小便不利  
若發汗後復煩脉浮者更可發汗有下之而煩者其  
苓四逆湯乾姜附子湯梔子厚朴湯梔子乾姜湯柴  
胡桂枝乾姜湯主之有發汗吐下已後府藏俱虛而  
熱氣不散虛煩者梔子豉湯梔子甘草湯竹葉湯又  
有病已解而又煩者此由病新差不勝殺損殺則愈  
若吐利脉微發厥而煩者當於少陰中求之黃連阿  
膠湯白通加猪膽湯猪苓湯猪膚湯竹葉湯

第七十二問躁者何也

躁有陰證有陽證當子細辨之脉洪實或滑促或熱

大便秘小便赤者陽躁也。脉微細足逆冷大便秘利者陰躁也太陽證煩躁大率宜汗。陽中風見寒脉傷寒見風脉汗不出加煩躁者大青龍主之太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴五苓散主之仲景云傷寒得病无熱俱狂言煩躁不安精采不與人相當勿以火導之但以五苓散二文目服之當與新汲井水飲一升許即令指刺喉吐去之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下當以瓜蒂散吐之陽明證煩躁大率宜下病人不大



便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥矢故也  
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下硬至四  
五日雖飲食以小承氣少少與微和之令小安陽毒  
散亦主熱病心躁陰證煩躁宜急溫之陽氣弱爲陰  
所乘而躁乾姜附子湯茯苓四逆湯吳茱萸甘草干  
姜湯主之昔人有患傷寒身冷脉微手足厥而躁甚  
醫以艾湯調硫黃末數錢與之即時安臥良久睡起  
汗出而愈傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不至誤入  
急用附子一枚可半兩者立劈作四片三姜一大塊  
劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一大斗煎

取六分去滓，如人體溫，頻服之。厚衣覆蓋，汗出，人不  
出候，心神定，即別消息服藥，慎不得身冷水，如渴將  
滓再煎，與喫。今人多用，有效。若傷寒脈微而厥，至七  
八日，膚冷而躁，無時暫安者，此爲藏厥。仲景无治法。  
第七十三問發黃者何也。

病人寒濕在裏不散，熱畜於脾胃，腸理不閉，瘀熱與  
宿穀相搏，鬱蒸不消化，故發黃。然發黃與瘀血外證  
及脈俱相似，但小便不利爲黃，小便自利爲瘀血。發  
黃之人發熱引飲，脈浮大滑實而緊數者，瘀血證多。  
發狂，大便必黑，此爲異耳。凡病人身體發熱渴引水。

漿

以其於心脾

小便不利。頭面汗出。齊頸而止。如此必

發黃。茵陳蒿湯。五苓加茵陳散。枳殼大黃散。病人服

湯得。小便如皂莢汁。赤。一宿腹減。則黃從小便出也。

古人云。凡治濕之病。不利小便。非其治也。梔子蘘皮

湯。麻黃連翹赤小豆湯主之。又方。傷寒欲發黃者。急

用瓜蒂末。口含。水搖入。鼻中出。黃水甚驗。使用五苓

茵陳湯尤良。

茵陳末十分。五苓末五分。

又問白虎証。身體熱。煩渴

引飲。小便不利。何以不發黃也。答曰。白虎証與發黃

證相近。但遍身汗出。此爲熱越。必下。白虎湯主

之。大抵發黃證。須是頭面汗出。頸以下都无汗。外

臺黃疽部并千金治黃家小便不利而赤色自不出此爲表和裏實宜下之大黃黃礬湯以石湯主之漢賢南方暑濕近夏瘴熱古人以黃爲毒濕熱相搏民多病瘰甚爲跗腫也

第七十四問發斑者何也

發斑有兩證有溫毒發斑有胃爛發斑也溫毒發斑者爲冬月溫暖人感乖戾之氣未即病發至春或被積寒所折毒氣未得泄至天氣喧熱溫毒始發則肌肉斑爛癍疹如錦紋而咳其治法在溫毒門中若胃爛發斑者傷寒未下即發斑下早亦發斑蓋不當下

而下之。熱米，虛入胃，當下而失下，則胃熱不得泄，所以皆發斑也。凡發斑不可用表藥，蓋表虛裏實，若發其汗，重令開洩，更增斑爛，表虛故也。玄參升麻湯、大青龍、四物湯、紫雪、化斑湯、白虎加人參湯、龍腦丸、加人參、名、化斑湯、出、其書中、更、傷寒、發斑、無、它、只是、與、紫雪、大妙、龍腦丸、亦佳也、熱氣在藏府，攻腸胃裏，先面成瘡，乃發出，外赤者易治，黑者難治，蓋毒氣入胃深故也。

第七十五問發狂者何也

發狂有三證：陽毒發狂，畜血發狂，狂、其、外、證、與脉皆不同。病人面赤，咽痛，脉洪大，洪、數、大、便、小、

便赤煩躁狂走或見鬼神者陽毒也。桂枝大黃湯浴  
腸湯。黑奴丸主之。病人无表證不可發汗。胸腹滿唇  
燥但欲漱水不欲嚥其脉微而沉但如熱狀煩滿口  
燥其脉反無熱此爲陰伏是瘀血也。小腹硬滿小便  
反利大便必黑身黃發狂血證諦也。太陽病不解熱  
結膀胱其人如狂其血必自下下者愈須解其外宜  
桂枝湯血上逆則喜忘血下畜則內爭甚者抵當湯  
輕者犀角地黃湯芍藥地黃加大黃黃芩湯桔梗大  
黃湯主之。大抵當汗不汗熱畜在裏熱化爲血其人  
喜忘而如狂須由抵當湯取盡黑物爲效未盡再服。

若火邪發狂醫以火於臥床下或周身用火迫劫汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之凡灸及燒針後證似火劫者並用火劫治之金匱風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯更捷

第七十六問譏語者何也

病人言語錯謬有虛實二証鄭聲屬虛常用溫藥治之譫言屬實當行大柴胡承氣湯服承氣湯而譫語不止者即勿服不爾再服之世多不辨白胃之狂言亂道尤不可不別也仲景云實則譫語虛則鄭聲

實者重也

證散不知偏下也。讞語者有然。讞語聲亦相以難  
誠信多狂言心誠之事也。

辨者更須用外證與脈別之。若大八。手足冷。脈

微細者必鄭聲也。大便秘小便赤手足溫。脈盛實者。

必讞語也。以此相參然後用藥萬全矣。然有火迫讞

語者有三陽合病讞語者。白虎湯證有胃實讞語者。

大承氣調胃承氣湯。玄參升麻湯主之。外臺承氣湯  
尤穩無芒硝

有已得汗身和讞語者。柴胡桂枝湯主之。此爲津液

不和。又小柴胡去人參加桂和其管衛以通津液。自

愈。恐人作燥屎攻之慎不可下也。有胃滿煩驚小便

不利。讞語者。柴胡加龍骨牡蠣湯有。婦人熱入血室。



譏語者婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譏語如見鬼狀者此爲熱入血室无犯胃氣及上二焦速用小柴胡治之若行湯遲熱入胃令津燥上焦中焦不榮血成結胃狀須當針期門也婦人中風發熱惡寒經水適來七八日熱除而脉遲身涼胃腸下滿如結胃狀譏語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之已上二焦熱結在期門也若犯胃氣晝夜不語甚忘小腹滿小便利屬抵當湯證有下利而譏語者調胃承氣湯小承氣湯大便利者宜連解毒湯傷寒譏語妄語自當有熱而反四逆脉沉細者

第七十七問病人但欲漱水不欲飲何也

病人頭疼身熱口燥但欲漱水不欲飲者必嘔也黃芩湯主之若胃滿唇痿舌青口燥但欲漱水不欲飲者無寒熱爲有瘀血必發狂也輕者犀角地黃湯芍藥地黃加大黃黃芩湯甚者抵當湯主之

第七十八問腹脹滿者何也

太素云胃中寒則腹脹素問曰藏寒生滿又曰藏火不及寒乃大行民病驚漉腹滿食飲不下寒中腸鳴以此觀之腹脹滿者大率寒證也桔梗半夏湯尤良仲景太陽證發汗後腹脹滿者厚朴生姜半夏甘草

人參湯下，後心煩腹滿，卧起不安者，梔子厚朴湯若  
陽明證，腹滿而喘，大便硬，有潮熱者，大承氣湯主之。  
吐後腹脹滿者，與調胃承氣湯。少陰病六七日，腹滿  
不大便者，急下之，宜大承氣湯。厥陰証下利，腹滿，身  
體疼痛者，先溫裏，乃可攻表。溫裏，四逆湯；攻表，桂枝  
湯。

第七十九問 腹脹痛者何也

難經云：痛者爲實。故有仲景桂枝加芍藥湯。痛甚者，  
加大黃，大抵腹滿而痛者，此爲實。凡加大芍藥湯  
即是小建中也。太陰脈弱自利，設當行，大黃芍藥者，

宜減之。其人胃虛，陽氣易動，故也。下利者，先煎芍藥，  
上余瀉。雖然，腹痛有二證，有虛痛，有實痛，不可不辨。  
也。人脈弦，腸鳴泄利而痛者，虛痛也。當行小建中湯。  
四逆加附子湯。真武湯。通脈四逆加芍藥湯。四逆散。  
桃花湯也。小建中湯。偏治腹中虛寒，補氣血，尤止腹  
痛。大抵腹痛按之不痛者，爲虛。腹滿時減復如故者，  
爲寒。虛寒之證，當用溫藥。按之而痛，大便不通，爲實。  
當用大黃輩。下之。小建中外臺治虛勞腹痛。夢遺失  
精。四支酸疼。手足煩熱。咽乾口燥。兼治婦人小腹痛。  
仲景云。陽脈溢。陰脈弦。當腹中急痛。宜與小建中湯。

實痛者小柴胡去黃芩加芍藥主之此二藥皆主腹  
痛關脉實腹滿按之痛者實痛也當行小柴胡去黃  
芩加芍藥湯桂枝大黃湯加黃連湯大承氣湯也  
者須是大便硬若心胃連臍腹大段在悶疼痛坐卧不安胃  
悶喘急用承氣急下之

第八十問痞者何也

病發於陽

在表發於陽

下之早因爲結胃發於陰

發於陰

下之

早因爲痞心下滿而硬痛者爲結胃但滿而不痛者  
爲痞痞結胃與痞似是而非若同而異以痛不痛  
爲異耳醫不審一有差互立致人死爲知是痞必先

用桔梗枳殼湯，桔梗枳殼但行氣，下膈先用之，不  
驗也。結胸與痞，關脈須皆沉。若關脈浮者，大黃黃連瀉心湯主  
之。心下痞按之濡，其關脈浮者，大黃黃連瀉心湯主  
之。痞有二種，有滿而硬者，桂枝人參湯；大柴胡湯、瓜  
蒂散、甘草瀉心湯、小柴胡湯、十棗湯、旋覆代赭湯、陽  
明病心下硬滿不可攻之，利不止死。有滿而濡者，半  
夏瀉心湯。大黃黃連瀉心湯、小柴胡加干姜湯。若不  
滿不硬，但覺心下妨悶者，非痞也。謂之支結。心下支  
結，小柴胡加桂湯主之。胃腸滿微結，小柴胡加干姜  
牡蠣湯主之。更隨證看病，冷熱於瀉心湯選用。冷證

如附子瀉心湯，理中湯之類，熱證如大黃黃連瀉心湯，五苓散之類，凡痞與瀉心湯痞不解，其人渴而口燥煩，小便不利者，五苓散主之。脇下痞硬者，屬小柴胡也。若脅下不快者，於小柴去枳加牡蠣主之。然有下利而心下痞者，十棗湯、大柴胡湯、生姜瀉心湯、甘草瀉心湯、赤石脂禹餘糧湯、桂枝人參湯，有惡寒而心下痞者，附子瀉心湯。病未解者，桂枝湯、大黃黃連瀉心湯。仲景云：太陽陽明醫發汗，遂發熱惡寒，因復下之，心下痞，表裏俱虛，陰陽並竭。無陽則陰胃煩面色青黃，膚甲者，難治。今微黃，手足溫者，易愈也。人陽

病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出亡惡寒不嘔且心  
下痞者此以醫下之也有嘔吐而心下痞者大柴胡  
湯甘草瀉心湯十棗湯小柴胡湯小半夏加茯苓湯  
以歸問有有頭疼而心下痞者及汗出而心下痞者  
不故也十棗湯凡痞服瀉心湯不愈乃可用大陷胃湯下之



傷寒百問卷六

第八十一問結胃者何也

病發於陽，反下之，熱入，因作結胃。傷寒在表，爲醫被誤，踈轉熱氣乘虛而入，痞結不散，便成結胃。若已轉了，初未成結胃，急頻與理中湯，自然解了，更不作此証。蓋理中治中焦，故也。此古人亦說不到，後來人消息得之，若大段轉損，有厥證者，兼與四逆湯，便安胃中，雖和傷寒熱未退者，卽候日數足可下，却以承氣再下之，蓋前時下得未足故也。其口下緊滿，按之石硬而痛，項強如柔痙，其脉寸口浮關尺皆沉，以沉

緊名曰結胃也。治法大率當下。仲景云下之則。然  
脉浮與大皆不可下。下之則死。汗也。然却  
無治法。今脉浮是尚有表證。須以小柴胡湯等先發  
表。表証去方用下。結胃藥便安。西晉崔行功云傷寒  
結胃欲絕。心膈高起。手不得近。用瀉心大陷胃湯皆  
不差者。此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻。氣毒  
相搏結於胃中。當用加減理中丸。理中丸內枳實十  
六片。數炒茯苓二兩。蜜丸如鷄子黃大。連進二三服。  
胃中豁然矣。用藥之速未見如此。渴者更加桔樓二  
兩。下者加牡蠣二兩。先理其氣。次療諸疾。古今用之。

如神應手而愈。然結胃有三種。有大結胃。不按而痛。爲大結胃。大陷胃湯主之。結胃丸最好。較穩。兼丸子。經宿乃下。其陷胃湯恐緊。有小結胃。按之而痛。爲小結胃。小陷胃湯主之。有木結在胃腸間。亦名結胃。但結胃无大熱者。以水結在胃腸間。但頭汗出者。大陷胃湯主之。又有寒熱二證。有熱實。結胃用大小陷胃丸。有寒實。結胃寒實。結胃无熱證者。三物白散主之。加減理中丸尤宜用之。近世多行金針丸。用硫黃陽起石者。若寒實。結胃行之。或有差。實。結胃行之。之必死也。又見雜方云。得結胃。傷寒嘔吐不止。心膈

痞塞諸藥無效。但口中微有氣者。可於臍中灸。一並

錄于此。以備緩急而已。

巴豆七粒。許石以黃連爲末。巴豆去壳。

研極細。入黃連末。研勻。按臍中。以艾粒指

頭大。灸之。輕者一炷。重者不過二炷。灸熟透。腹中作

後。常服和氣藥。又問。藏結者何也。藏結者死。仲

景無治法。大抵藏結。其證如結胃狀。飲食如故。時時

下利。陽脈浮。關脈小。細沉緊。名曰藏結。舌上白胎。滑

者難治也。又曰。藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。

舌胎滑者。不可攻也。二者病人。脇下舊有痞連在。臂

傍痛引。小腹入陰筋者。亦名藏結。死不治。是所醫人

可留心也。

第八十二問喘者何也

華佗云盛而爲喘，減而爲粘。大凡發喘者，氣有餘故嘶聲，傷寒只有太陽陽明二證。太陽喘須表葛根黃芩湯，麻黃湯桂枝加厚朴杏子湯；麻黃杏子甘草石膏湯，麻黃杏仁湯。陽明病須下，腹滿而喘，有潮熱者大承氣主之。然陽明中寒，脈浮無汗，其人必喘，亦發汗則愈。麻黃湯主之。又有發汗後飲水多，必喘，以水停心下，腎氣乘心故喘也。小青龍去麻黃加杏仁，若脈浮手足微厥，面垢唇青，昏憤而喘足者，爲陰陽不和，尚阻升降，宜服五味子湯。陰證發喘，則脈先起矣。

陰毒喘促者與來麴丹入口便定

第八十三問咳逆者何也

咳逆者古人所謂噦者是也傷寒咳逆雖仲景書中  
不說非無也孫真人云咳逆遍醫方論無此名稱深  
窮其狀咳逆者噦逆之名大抵噦者胃中虛冷故也  
橘皮竹茹湯橘皮湯半夏生姜湯退陰散桂朮散並  
上之服藥無效者雄黃末二錢用酒一盞煎七分急  
令病人鼻嗅其熱氣即止又方用硫黃乳香等分爲  
末以酒煎更令嗅之亦妙法也若咳逆百方不差每  
一咳至八九聲相連收氣不聞至於驚入者灸之必

愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指爲率正與乳相直間陷中動脈處是也男左女右艾炷如小豆許

第八十四問嗜卧者何也

風溫爲病多眠必衾藁湯主之太陽陽明嗜卧皆可與小柴胡若少陰病脈微細但欲寐急作四逆湯復其陽不可緩也非特少陰也熱病得汗身冷脈細欲絕其人已安靜但昏沉喜睡亦急與四逆輩令手足溫不爾發瘵而死若狀如傷寒日二重忽忽喜眠須看上下唇上唇有瘡虫蝕五莖下唇有瘡虫蝕

下部當作狐惑治之

第八十五問不得眠者何也

病人未得汗若心煩不得眠欲飲水者當稍與水令  
胃中和則愈若脈浮小便不利五苓散主之傷寒二  
三日以上心煩不得卧黃連阿膠湯主之若發汗若  
吐若下後虛煩不得眠劇則反覆顛倒心中懊憹者  
屬梔子湯若少氣腹滿者屬梔子四逆湯若乾嘔者  
屬梔子生薑湯若腹脹滿屬梔子厚朴湯下後復發  
汗晝日煩躁不得眠夜則安靜脈沉微身無大熱者  
乾姜附子湯主之大熱煩躁錯語不得眠黃連解毒



湯汗解因飲酒復劇煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得  
卧亦宜服之傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠酸棗  
湯若少陰証下利而渴不得眠猪苓湯又問傷寒  
差後不得睡者何也蓋熱氣未散與諸陽相并陰氣  
不復所以仍不得睡黃連芍藥黃芩阿膠湯主之

第八十六問大便溏者何也

病人腸中有寒則大便鳴漉蓋漉者胃中冷水穀不  
別故也華佗云寒則漉熱則鳴仲景曰初鞭後漉有  
二證小便不利小便少皆爲水穀下下

第八十七問下利者何也

傷寒下利有三種太陽陽明合病必下利葛根湯主之太陽少陽合病自下利黃芩湯主之黃芩加半夏生姜湯陽明少陽合病必下利陽明者土其脉長大少陽者木其脉弦若合病土被木賊更下利爲胃已困若脉不弦者順也爲土不負負者死脉滑而數者有宿食當下之大承氣湯其餘下利皆經汗下後證也太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之傷寒醫下之續而下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯

傷寒十三日不解。胃脘滿而疼。身痛必發潮熱。已而微利。此本柴胡下之不得利。今反利者。知醫以九子藥下之非其治也。潮熱者實也。先以小柴胡湯解外。後以大柴胡湯下之。傷寒十三日過經。譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利。痛大便當硬。而反下利。床調者。知醫以九子藥下之。若自下利者。床當微利。今反和者。此爲實也。調胃承氣主之。太陽中風下利。嘔逆表解者。可攻之。其人漿漿汗出。發作有時。頭疼。心下痞硬滿。引脅下痛。乾嘔短氣。干嘔。惡寒者。此表解裏未和也。十棗湯主之。傷寒汗出。解之後。口中

不和心下痞硬乾噫食臭脇下有<sub>二</sub>氣<sub>一</sub>腹中雷鳴下  
利者生薑瀉心湯主之傷寒中風<sub>一</sub>之其人下  
利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔  
心煩不得安<sub>一</sub>依<sub>二</sub>兄<sub>一</sub>心下痞謂病不盡復下之其痞益  
甚此爲結熱但以<sub>二</sub>胃中虛客氣上逆<sub>一</sub>故使痞也甘草  
瀉心湯主之傷寒服湯藥下利不吐心下痞結者瀉  
心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益  
甚<sub>一</sub>調治中焦而利下焦赤石脂禹余糧湯主之復  
不止者當利其小便五苓散主之太陽病外證未除  
而數下之遂<sub>二</sub>膿<sub>一</sub>而利利不止心下痞硬表裏不解

者桂枝人參湯主之。傷寒發熱汗出而後心下痞不  
嘔吐而下利者人參胡湯主之。若病傳到陰經不吐  
即利但自利不渴屬太陰自利而渴屬少陰宜先用  
黃芩阿膠湯止煩兼預斷利也。大抵下利須看脈與  
外證下利脈大者虛也下利十餘行脈反實者死下  
利脈數而滑者有宿食也下之愈脈遲而滑者實也  
其利未得便止當更下之下利三部脈皆平按其心  
下硬者急下之三陽下利身熱太陽下利手足自溫  
少陰厥陰下利身不熱雖然自利可下少陰然三  
陽下利欲飲水者乃有熱也三陰下利宜溫之然少

陰自利清水心下痛口乾燥者却宜下之。及陰下利  
譏語者有燥屎也亦須下之不可不也。要之腸熱  
利者臍下必熱須赤黃色及腸間津汁垢膩寒毒入  
胃則臍下必寒須黃白色或青黑或下利清穀寒則  
用四逆湯埋中湯當歸四逆湯四逆加薤白湯熱則  
用黃蘗湯調中湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯黃  
芩芍藥湯赤石脂丸下膿血者少陰證桃花湯熱毒  
便血者勝金散檉皮湯小兒下血黃蘗散須子細辨  
識陰陽勿令差互也。

第八十八問數日不大便又有大便難又有大便

硬又曰有燥屎何也

傷寒數日不大便大便難及有燥屎皆知用大柴胡  
大承氣小承氣攻之然仲景論大便不通亦有數種  
不可攻者不可不別也陰結者不可攻也若陰結者  
何也答云其脉沉而遲不能食身重大便難名曰陰  
結陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內  
竭雖硬不可攻之當須自大便審導之亦土瓜根及  
大猪膽汁皆可爲導陽明病腸下硬滿不大便而嘔  
舌上白胎者不可攻之宜與小柴胡二藥得通津液  
得下胃氣因和身濇然汗出而解陽明病不大便六

七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不申夕者此但初硬後必溏不可攻之攻之心腹滿不能食也大便秘堅小便數不可用承氣湯攻之跌陽脈浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮濡相搏則大便秘其脾爲約麻子仁丸主之千金云脾約者大便秘小便便利宜枳實丸太陽陽明者脾約是也大便秘小便少者不可攻也恐津液還入胃必先硬後溏也小便自如乃可攻之當問其小便日幾行若未小便日三四行今已再行故知大便不久出以此知古人慎用轉藥如此金



匿云傷寒病六七日雖不大便傳而无所苦者尤不可下。下之早熱氣乘虛入胃輕者難愈重者必死也。

第八十九問小便不利者何也

傷寒發汗後汗出多亡津液胃中極乾故小便不利。醫見小便不利往往利之誤矣。類纂云胃中乾則無小便慎不可利。故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液故也。勿治之得小便利必自愈。或曰小便終不可利耶曰不然此謂汗後亡津液耳。若傷寒別飲下焦有熱小便不通脉浮者五苓散。若苓散也。表不解心下有水發熱而咳小腹滿小便不利者小青

龍湯去麻黃加茯苓也。傷寒无汗身重發熱頭項強痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也。嘔而發熱身脇滿心下怔忡小便不利者小柴胡湯去黃芩加茯苓也。少陰病小便不利者四逆湯加茯苓也。若陰毒傷寒加以小便不通及陰囊縮入小腹絞痛欲死者須是大段急灸之仍可與追陰丹當歸四逆加茱萸姜湯慎勿與尋常利小便藥此是陰氣在小腹故也。世醫見小便不通便以鹽及燥熱藥於臍下熨欲望小便通不知陰氣在小腹之間致被熱物熨蒸无處出得即奔上心。性性有死者大抵風濕與發黃

以利小便爲先。風濕甘草附子湯。發黃茵陳湯。陽明汗多。以利小便爲低。表虛裏實是。故汗多。自然无小便也。又問小便難者何也。陰虛故也。陰虛陽必淡。之是以難也。

第九十問小便自利者何也

太陽證下焦有熱。小腹必滿。應小便不利。而小便反利者。下血證也。抵當湯主之。陽明證自汗出。應小便少。而小便自利者。津液內竭也。大便雖硬。不可攻之。當用蜜煎導之。少陰證四逆。而小便自利者。虛寒證也。四逆湯。真武湯加茯苓主之。又問小便數者何

傷寒百問 卷之六  
也。腎與膀胱俱虛而有客熱乘之也。二經既虛致受  
於客熱虛則不能制水故令數小便熱以水行流注  
則小便不快故令數起也。診其趺陽脈數胃中熱即  
消穀引飲大便必硬小便即數也。

第九十一問壞傷寒何也

傷寒已經發汗吐下溫針仍不解小柴胡證罷者即  
名壞病仲景云太陽病三日已發汗若吐若下若溫  
針仍不解者爲壞病桂枝不可與也當知何逆隨證  
治之。又云太陽病不解轉入少陽者脇下鞅滿乾嘔  
不能食往來寒熱尚未吐下其脈沉緊者可與小柴

胡湯其小柴胡證罷者爲壞病蓋証候不順又感異氣變成此証以時令寒暑燥濕風氣不節脉息與少陽相異證候與傷寒不同明當消息其由以法治之又傷寒過經再受熱邪留畜藏府病候多變而久不差陰陽無復綱紀皆名壞傷寒無憂散知母麻黃湯鱉甲散黑奴丸大黃桂心湯主之

第九十二問狐惑濕匿傷寒何也

狐惑與濕匿皆蟲證也初得狀如傷寒或因傷寒變成斯疾其候默默欲眠目不能閉起行不安蟲蝕其喉爲惑其聲啞蟲食下部爲狐也狐惑之病咽乾惡

飲食面目乍赤乍白，乍黑是其證也。甘草瀉心湯。白湯雄黃薰法。赤豆當歸散。黃芩飲。王<sub>之</sub>若病人齒<sub>无</sub>色。舌上盡白甚者，唇黑有瘡，四支沉重，忽忽喜眠者，皆爲蟲五藏及食其肝，須頻看其上下唇上唇有瘡蟲食其藏也。下唇有瘡者，蟲食其肛也。殺人甚急，治蜜桃仁湯。黃連犀角湯。雄黃銳散主之。

第九十三問 百合傷寒何也

百脉一宗，悉致其病，無復經絡也。其狀欲食復不能食，常默默欲得卧復不卧，欲出行復不能行，飲食或有不美，時或有不快，食時如強健人而卧不能行，如有

寒如無寒。如有熱如無熱。口苦。小便赤。百合之病。諸藥不効。藥入即吐利。如有神靈。此多因傷寒虛勞大病之後。不平復。變成斯疾也。百合知母湯。滑石代赭湯。鷄子湯。地黃湯。百合洗方。枯梗牡蠣散。滑石散主之。千金曰。百合病見在於陰。而攻其陽。則陰不得解也。復發其汗。爲逆也。見在於陽。而攻其陰。則陽不得解也。復下之。其病不愈。金匱要略云。百合病見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此爲逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦爲逆。其病

難愈

第九十四問霍亂何也

霍亂有二証。嘔吐而下利名曰霍亂。不止不利。腹滿煩悶絞痛短氣名曰乾霍亂。嘔吐下利熱多而渴者。五苓散。寒多不飲水者。理中丸。或有寒腹滿痛或四支拘急或下利轉筋。理中加附子一枚。生用作湯服。吐利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥冷者。四逆湯。吐利止而身體痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯少和之。中暑霍亂非時吐利。心腹撮痛大渴煩燥四肢厥逆。冷汗自出。兩腳轉筋。宜服無比香薷散。須井中沉令極冷。頻服之。乃効。扁豆湯治中湯。四順附



子湯小麥湯皆妙。乾霍亂者，冷氣搏於脾胃，飲食不消，但腹滿煩悶絞痛，短氣，其脾胃先夾食，故不吐利。柳宗元鹽湯紫蘊丸主之。

第九十五問傷寒勞復食復何也

傷寒病新差，津液未復，血氣尚虛，勞動早，則病復成。蓋勞則生熱，熱氣乘虛還入經絡，故病復如初。脈浮者，以汗解，沉緊者，宜下之。渴者，五苓散。大抵勞復不宜大段發汗，亦不宜大段下之，爲氣血先已虛也。小柴胡湯、豆豉湯尤良。梔子、桂枝湯、枳實、梔子湯、竹葉石膏湯皆可選用之。熱病已，胃氣尚弱，不能節飲食。

則成食復減食則愈。梔子桂心湯。枳實梔子加大黃湯也。

第九十六問傷寒不思食何也

陽明病能食名中風不能食名傷寒不思食不足怪也。傷寒是變與雜病不同。病人不思食醫人謂脾胃不和便服和胃藥遂令胃熱疾勢轉增。凡傷寒无和胃之理。

第九十七問傷寒不得用九子藥者何也

寒邪流傳經絡无有定舍隨經蕩滌猶恐不及况熱氣無積聚可破无堅癰可消固不當用九子也。仲景

云醫以九子，熱下之，非其治也。又問仲景有陷胃九，麻子仁九，何也？陷胃九，結胃證也。麻子仁九，脾約證也。

第九十八問 妊婦傷寒其治法如何？

妊婦傷寒，白朮散、葱白散、前胡散、大黃湯、知母湯、大青龍湯、地黃湯也。黃龍湯尤。小紫胡去半夏名黃龍湯蓋爲妊婦而去也

主產後傷寒，熱入胞宮，寒熱如瘧，或狂言見鬼，產前、先、安胎、產後先補益，次服傷寒藥。若病稍退，則止。不可盡劑爲此戒。安胎四物湯補益，當歸建中湯。

第九十九問 小兒傷寒其治法如何？

小兒傷寒如大人法。但用小分劑。藥性微冷耳。小兒病證未會說難辨。當子細別之。尋常風壅發熱。鼻湯痰嗽煩渴。惺惺散主之。頭額身體溫熱。大便黃而臭。腹中有熱。四順散主之。頭額身體溫熱。大便帶白而酸氣者。胃中夾食。丁香丸主之。頭額身體壯熱。頭目碎痛。心神煩躁。小便赤。大便不利。此熱劇也。調胃承氣湯主之。頭額痛。身體熱。而畏人惡寒。此傷寒證也。無汗者。麻黃黃芩湯有汗者。升麻黃芩湯。保生散。七寶散。升麻散。春月小兒踈轉。只服大黃川芎散尤佳。慎忌用丸子藥也。

第一百問小兒瘡疹發熱類傷寒何以別之

小兒瘡疹發熱與傷寒相似。但耳鼻及尻尖冷耳並耳後有赤脈。其脈長大。身體壯熱。或時驚搐。以之別瘡疹。慎不可轉。若轉則毒氣入裡。殺人。卽與化毒湯。紫草木通湯。出得大盛。卽用犀角地黃湯解之。若出豆不快。煩躁不得眠者。黃芩甘草主之也。

傷寒百問卷六大尾

寶曆三年癸酉正月吉旦

大坂心齋橋願慶町

書林

澁川清右衛門